

Reduksjon av hanskebruk med 30 %:

Og reduksjon av helsetjeneste assosierte infeksjoner
med 10 %.

Feil bruk av hanskar aukar:

- 1) Kontaminering av miljøet.
- 2) Risiko for helsetenesteassosierte infeksjonar (HAI).
- 3) Førekomst av hudirritasjon og såre hender hjå tilsette.



Fhi.no

Nasjonal én-helse strategi mot antibakteriell resistens, 2024–2033

- Hovedmål 1: Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i helseinstitusjoner - Helsedirektoratet

[Regjeringen.no](https://www.regjeringen.no)

Delmål 2 - redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner - Helse Vest RHF

Bakgrunn for mål både nasjonale og regionale.

ECDC har estimert at det er over 3,5 millioner helsetjenesteassosierte infeksjoner hvert år i EØS-landene.

Viktige andre aspekt ved reduksjon av HAI:

- 1) Unngår spredning av antibiotikaresistente mikrobar.**
- 2) Unngå unødvendig og feil bruk av antibiotika.**



10% reduksjon kan bety at 350.000 ikke blir påført infeksjon i helseteneste kvart år.



Antatte norske tal: 30.000-50.000 HAI pr. år. Som kan bety at 3000-5000 unngår å bli påført infeksjon kvart år.

- Så er det dessverre ikkje slik at reduksjon av hanskebruk aleine vil redusera sjukehusinfeksjonane med 10 %.

- Men vil i lag med andre tiltak være viktige bidrag til arbeidet med å redusere antal infeksjonar innan helse.



Korleis heng så disse to måla i lag?

- Vi veit at når hanskar vert nytta på feil indikasjon aukar risiko for helsetjenesteassosierte- infeksjoner.

- **Fordi:**
- *Studier viser også at overforbruk av hansker fører til redusert etterlevelse av håndhygiene og derved redusert pasientsikkerhet.*
- *Handhygiene vert ikkje gjennomført etter indikasjon før -etter hanskebruk.*
- *Hanske vert ikkje bytta undervegs- men brukt i heile stellet.*

en mindre observasjonsundersøkelse gjennomført ved norske sykehjem, fant at i 24–58 % av situasjonene der hansker ble benyttet, var hanskebruk ikke indisert . Gitt et totalforbruk på 300 millioner, kan man anslå at norsk helsetjeneste har et unødvendig forbruk på mellom 70 og 175 millioner engangshansker hvert år. Dette tilsvarer inntil 1 225 tonn unødvendig avfall årlig.

(tidsskrift for den norske legeforening 2024).



- **Hender vert lett forureina når hanske tas av.**
- **Opp til 30% av tilsette har smittestoff fra smitta pasient på hendene etter hanske er tatt av.**
- **Mikroskopiske hol i mange usterile hanskar.**
- **50% av helsepersonell utfører ikkje handhygiene etter anbefalingane.**

INDIKASJONAR FOR BRUK AV HANSKAR



- Hanske skal beskytte mot forureining og være ein barriere mot smittespredning og kryssmitte!

- 1) **Ved kontakt med kroppsvæsker, blod, sekret, slimhinner, ikkje intakt hud.**
- 2) **Infeksiøst materiale.
Forureina gjenstandar og overflater.**
- 3) **Ved kontakt med isolert pasient eller
hens omgivelsar.**
- 4) **Handtering av kjemikaliar og
medikament som kan være skadeleg.**
- 5) **Tilsette med sår eller skader på hendene**



Hanskevett- reglane

Bruk hanske kun på indikasjon.

Hanskane skal på rett før og takast av rett etter ferdig prosedyre.

°etter ureint arbeide, eks nedantil-stell og før du tek i reine ting, gjeld og på smitteisolat.

°Gjerne behov for å skifte hanskar undervegs hjå same pasient.

Hugs alltid handhygiene!!

°Hugs at hanskar minimera, men ikkje eliminera forureining av hendene.

Reduserer ikkje behovet for handhygiene.

- Spørsmål?

